



## त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएँ (Trigonometric Identities)



### 7.01 प्रस्तावना (Introduction)

हमने पूर्व अध्याय में त्रिकोणमितीय अनुपातों एवं उनमें पारस्परिक सम्बन्धों में अध्ययन किया है। इस अध्याय में त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाओं का अध्ययन करेंगे।

#### त्रिकोणमितीय सर्वसमिकायें:

त्रिकोणमितीय सर्वसमिका त्रिकोणमितीय सम्बन्धित कोणों के सभी मानों के लिए सत्य होती है। यहाँ निम्न सर्वसमिकाओं की उत्पत्ति पर विचार करते हैं।

आकृतिनुसार,  $\Delta ABC$  में  $\angle B$  समकोण है। कोण  $\theta$  के लिए,  $BC$  लम्ब,  $AB$  आधार व  $AC$  कर्ण होगा।

$$\text{अतः} \quad BC^2 + AB^2 = AC^2 \quad \dots (1)$$


समीकरण (1) के प्रत्येक पद को  $AC^2$  से भाग देने पर

$$\frac{BC^2}{AC^2} + \frac{AB^2}{AC^2} = \frac{AC^2}{AC^2}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{BC}{AC}\right)^2 + \left(\frac{AB}{AC}\right)^2 = \left(\frac{AC}{AC}\right)^2$$

$$\Rightarrow (\sin \theta)^2 + (\cos \theta)^2 = 1$$

$$\Rightarrow \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \quad \dots (2)$$



आकृति 7.01

यह सभी  $\theta$ , जहाँ  $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$  के लिए सत्य होता है।

यह एक सर्वसमिका है,

अब समीकरण (1) के प्रत्येक पद को  $AB^2$  से भाग देने पर

$$\frac{BC^2}{AB^2} + \frac{AB^2}{AB^2} = \frac{AC^2}{AB^2}$$

$$\left(\frac{BC}{AB}\right)^2 + \left(\frac{AB}{AB}\right)^2 = \left(\frac{AC}{AB}\right)^2$$

$$(\tan \theta)^2 + 1 = (\sec \theta)^2$$

$$\Rightarrow \tan^2 \theta + 1 = \sec^2 \theta$$

$$\Rightarrow 1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta \quad \dots (3)$$

अब समीकरण (1) के प्रत्येक पद को  $BC^2$  से भाग देने पर

$$\frac{BC^2}{BC^2} + \frac{AB^2}{BC^2} = \frac{AC^2}{BC^2}$$

$$\left(\frac{BC}{BC}\right)^2 + \left(\frac{AB}{BC}\right)^2 = \left(\frac{AC}{BC}\right)^2$$

$$1 + (\cot \theta)^2 = (\operatorname{cosec} \theta)^2$$

$$1 + \cot^2 \theta = \operatorname{cosec}^2 \theta \dots (\text{iv})$$

उपरोक्त सर्वसमिकाओं को निम्न प्रकार लिख सकते हैं—

1.  $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$   
या  $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$   
या  $\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta$
2.  $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$   
या  $\sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1$   
या  $\tan^2 \theta = \sec^2 \theta - 1$
3.  $1 + \cot^2 \theta = \operatorname{cosec}^2 \theta$   
या  $\operatorname{cosec}^2 \theta - \cot^2 \theta = 1$   
या  $\cot^2 \theta = \operatorname{cosec}^2 \theta - 1$

### सारणी

	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$	$\cot \theta$	$\sec \theta$	$\operatorname{cosec} \theta$
$\sin \theta$	$\sin \theta$	$\sqrt{1 - \cos^2 \theta}$	$\frac{\tan \theta}{\sqrt{1 + \tan^2 \theta}}$	$\frac{1}{\sqrt{1 + \cot^2 \theta}}$	$\frac{\sqrt{\sec^2 \theta - 1}}{\sec \theta}$	$\frac{1}{\operatorname{cosec} \theta}$
$\cos \theta$	$\sqrt{1 - \sin^2 \theta}$	$\cos \theta$	$\frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \theta}}$	$\frac{\cot \theta}{\sqrt{1 + \cot^2 \theta}}$	$\frac{1}{\sec \theta}$	$\frac{\sqrt{\operatorname{cosec}^2 \theta - 1}}{\operatorname{cosec} \theta}$
$\tan \theta$	$\frac{\sin \theta}{\sqrt{1 - \sin^2 \theta}}$	$\frac{\sqrt{1 - \cos^2 \theta}}{\cos \theta}$	$\tan \theta$	$\frac{1}{\cot \theta}$	$\sqrt{\sec^2 \theta - 1}$	$\frac{1}{\sqrt{\operatorname{cosec}^2 \theta - 1}}$
$\cot \theta$	$\frac{\sqrt{1 - \sin^2 \theta}}{\sin \theta}$	$\frac{\cos \theta}{\sqrt{1 - \cos^2 \theta}}$	$\frac{1}{\tan \theta}$	$\cot \theta$	$\frac{1}{\sqrt{\sec^2 \theta - 1}}$	$\sqrt{\operatorname{cosec}^2 \theta - 1}$
$\sec \theta$	$\frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 \theta}}$	$\frac{1}{\cos \theta}$	$\sqrt{1 + \tan^2 \theta}$	$\frac{\sqrt{1 + \cot^2 \theta}}{\cot \theta}$	$\sec \theta$	$\frac{\operatorname{cosec} \theta}{\sqrt{\operatorname{cosec}^2 \theta - 1}}$
$\operatorname{cosec} \theta$	$\frac{1}{\sin \theta}$	$\frac{1}{\sqrt{1 - \cos^2 \theta}}$	$\frac{\sqrt{1 + \tan^2 \theta}}{\tan \theta}$	$\sqrt{1 + \cot^2 \theta}$	$\frac{\sec \theta}{\sqrt{\sec^2 \theta - 1}}$	$\operatorname{cosec} \theta$

### दृष्टांतीय उदाहरण

**उदाहरण-1.** सिद्ध किजिए कि  $\cot \theta + \tan \theta = \operatorname{cosec} \theta \sec \theta$

**हल:** LHS (वाम पक्ष) =  $\cot \theta + \tan \theta$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\cos \theta}{\sin \theta} + \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} \quad (\because \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1) \\
&= \frac{1}{\sin \theta \cos \theta} = \frac{1}{\sin \theta} \cdot \frac{1}{\cos \theta} \\
&= \operatorname{cosec} \theta \cdot \sec \theta = \text{RHS दक्षिण पक्ष}
\end{aligned}$$

**उदाहरण-2.** सिद्ध किजिए कि  $(1 + \tan^2 \theta)(1 + \sin \theta)(1 - \sin \theta) = 1$

**हल:** LHS (वाम पक्ष)  $= (1 + \tan^2 \theta)(1 + \sin \theta)(1 - \sin \theta)$

$$\begin{aligned}
&= (1 + \tan^2 \theta)(1 - \sin^2 \theta) \\
&= \sec^2 \theta \cos^2 \theta \\
&= \frac{1}{\cos^2 \theta} \cdot \cos^2 \theta \\
&= 1 = \text{RHS (दक्षिण पक्ष)}
\end{aligned}$$

**उदाहरण-3.** सिद्ध किजिए कि  $\frac{1}{1 + \sin \theta} + \frac{1}{1 - \sin \theta} = 2 \sec^2 \theta$

**हल:** LHS (वाम पक्ष)  $= \frac{1}{1 + \sin \theta} + \frac{1}{1 - \sin \theta}$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1 - \sin \theta + 1 + \sin \theta}{(1 + \sin \theta)(1 - \sin \theta)} \\
&= \frac{2}{1 - \sin^2 \theta} = \frac{2}{\cos^2 \theta} = 2 \cdot \frac{1}{\cos^2 \theta} \\
&= 2 \sec^2 \theta = \text{RHS (दक्षिण पक्ष)}
\end{aligned}$$

**उदाहरण-4.** सिद्ध किजिए कि  $\sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta}} = \operatorname{cosec} \theta + \cot \theta$

**हल:** LHS (वाम पक्ष)  $= \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta}}$

अंश व हर को  $\sqrt{1 + \cos \theta}$  से गुणा करने पर

$$\begin{aligned}
&\sqrt{\frac{(1 + \cos \theta)}{(1 - \cos \theta)} \times \frac{(1 + \cos \theta)}{(1 + \cos \theta)}} \\
&= \sqrt{\frac{(1 + \cos \theta)^2}{1 - \cos^2 \theta}} = \sqrt{\frac{(1 + \cos \theta)^2}{\sin^2 \theta}} \\
&= \frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta} = \frac{1}{\sin \theta} + \frac{\cos \theta}{\sin \theta} \\
&= \operatorname{cosec} \theta + \cot \theta = \text{RHS दक्षिण पक्ष}
\end{aligned}$$

**उदाहरण-5.** सिद्ध कीजिए कि  $(\sec \theta - \tan \theta)^2 = \frac{1 - \sin \theta}{1 + \sin \theta}$

**हल:** LHS (वाम पक्ष)  $= (\sec \theta - \tan \theta)^2$

$$= \left( \frac{1}{\cos \theta} - \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \right)^2 = \left( \frac{1 - \sin \theta}{\cos \theta} \right)^2$$

$$= \frac{(1 - \sin \theta)^2}{\cos^2 \theta} = \frac{(1 - \sin \theta)^2}{1 - \sin^2 \theta}$$

$$= \frac{(1 - \sin \theta)(1 - \sin \theta)}{(1 - \sin \theta)(1 + \sin \theta)}$$

$$= \frac{1 - \sin \theta}{1 + \sin \theta} = \text{RHS (दक्षिण पक्ष)}$$

**उदाहरण-6.** सिद्ध कीजिए कि  $\frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} + \frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta} = 2 \operatorname{cosec} \theta$

**हल:** LHS (वाम पक्ष)  $= \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} + \frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta}$

$$= \frac{\sin^2 \theta + (1 + \cos \theta)^2}{\sin \theta(1 + \cos \theta)}$$

$$= \frac{\sin^2 \theta + 1 + \cos^2 \theta + 2 \cos \theta}{\sin \theta(1 + \cos \theta)}$$

$$= \frac{1 + \sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 2 \cos \theta}{\sin \theta(1 + \cos \theta)}$$

$$= \frac{1 + 1 + 2 \cos \theta}{\sin \theta(1 + \cos \theta)} = \frac{2 + 2 \cos \theta}{\sin \theta(1 + \cos \theta)}$$

$$= \frac{2(1 + \cos \theta)}{\sin \theta(1 + \cos \theta)} = \frac{2}{\sin \theta} = 2 \cdot \frac{1}{\sin \theta}$$

$$= 2 \operatorname{cosec} \theta = \text{RHS (दक्षिण पक्ष)}$$

**उदाहरण-7.** सिद्ध कीजिए  $\frac{\sin \theta - 2 \sin^3 \theta}{2 \cos^3 \theta - \cos \theta} = \tan \theta$

**हल:** LHS (वाम पक्ष)  $= \frac{\sin \theta - 2 \sin^3 \theta}{2 \cos^3 \theta - \cos \theta}$

$$= \frac{\sin \theta(1 - 2 \sin^2 \theta)}{\cos \theta(2 \cos^2 \theta - 1)}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\sin \theta [\sin^2 \theta + \cos^2 \theta - 2 \sin^2 \theta]}{\cos \theta [2 \cos^2 \theta - (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)]} \quad (\because \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1) \\
&= \frac{\sin \theta [\cos^2 \theta - \sin^2 \theta]}{\cos \theta [\cos^2 \theta - \sin^2 \theta]} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \\
&= \tan \theta = \text{RHS (दक्षिण पक्ष)}
\end{aligned}$$

**उदाहरण-8.** सिद्ध कीजिए कि  $\frac{1 + \sec A}{\sec A} = \frac{\sin^2 A}{1 - \cos A}$

**हल:** LHS (वाम पक्ष)

$$\begin{aligned}
&= \frac{1 + \sec A}{\sec A} \\
&= \frac{1 + \frac{1}{\cos A}}{\frac{1}{\cos A}} = \frac{\cos A + 1}{\cos A} = \frac{\cos A + 1}{\cos A} \times \frac{\cos A}{1} \\
&= \frac{1 + \cos A}{1} \\
&= \frac{(1 + \cos A)(1 - \cos A)}{1 - \cos A} \quad \{\text{अंश व हर में } (1 - \cos A) \text{ से गुणा करने पर}\} \\
&= \frac{(1)^2 - (\cos A)^2}{1 - \cos A} = \frac{1 - \cos^2 A}{1 - \cos A} \\
&= \frac{\sin^2 A}{1 - \cos A} = \text{RHS (दक्षिण पक्ष)} \quad (\because 1 - \cos^2 A = \sin^2 A)
\end{aligned}$$

**उदाहरण-9.** सिद्ध कीजिए कि  $\cos^4 \theta - \sin^4 \theta = 1 - 2 \sin^2 \theta$

**हल:** LHS (वाम पक्ष)

$$\begin{aligned}
&= \cos^4 \theta - \sin^4 \theta \\
&= (\cos^2 \theta)^2 - (\sin^2 \theta)^2 \\
&= (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) \quad \because a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) \\
&= 1 \cdot (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) \quad \because \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \\
&= 1 \cdot (1 - \sin^2 \theta - \sin^2 \theta) = 1 - 2 \sin^2 \theta = \text{RHS (दक्षिण पक्ष)}
\end{aligned}$$

**उदाहरण-10.** यदि  $\sin \theta + \cos \theta = p$  और  $\sec \theta + \operatorname{cosec} \theta = q$  हो, तो सिद्ध कीजिए कि  $q(p^2 - 1) = 2p$

**हल:** LHS (वाम पक्ष)  $= q(p^2 - 1)$

$p$  व  $q$  का मान रखने पर

$$\begin{aligned}
&= (\sec \theta + \operatorname{cosec} \theta) [(\sin \theta + \cos \theta)^2 - 1] \\
&= \left( \frac{1}{\cos \theta} + \frac{1}{\sin \theta} \right) [\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta - 1]
\end{aligned}$$

[101]

$$\begin{aligned}
&= \left( \frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sin \theta \cos \theta} \right) [1 + 2 \sin \theta \cos \theta - 1] \\
&= \left[ \frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sin \theta \cdot \cos \theta} \right] \times (2 \sin \theta \cos \theta) \\
&= 2[\sin \theta + \cos \theta] = 2p = \text{RHS (दक्षिण पक्ष)}
\end{aligned}$$

**उदाहरण-11.** सिद्ध कीजिए कि  $\frac{\cot A + \operatorname{cosec} A - 1}{\cot A - \operatorname{cosec} A + 1} = \frac{1 + \cos A}{\sin A}$

**हल:** LHS (वाम पक्ष)

$$\begin{aligned}
&= \frac{\cot A + \operatorname{cosec} A - 1}{\cot A - \operatorname{cosec} A + 1} \\
&= \frac{(\cot A + \operatorname{cosec} A) - (\operatorname{cosec}^2 A - \cot^2 A)}{\cot A - \operatorname{cosec} A + 1} \quad (\because \operatorname{cosec}^2 A - \cot^2 A = 1) \\
&= \frac{(\operatorname{cosec} A + \cot A) - [(\operatorname{cosec} A + \cot A)(\operatorname{cosec} A - \cot A)]}{\cot A - \operatorname{cosec} A + 1} \\
&= \frac{(\operatorname{cosec} A + \cot A)[1 - (\operatorname{cosec} A - \cot A)]}{\cot A - \operatorname{cosec} A + 1} \\
&= \frac{(\operatorname{cosec} A + \cot A)[\cot A - \operatorname{cosec} A + 1]}{(\cot A - \operatorname{cosec} A + 1)} \\
&= \operatorname{cosec} A + \cot A \\
&= \frac{1}{\sin A} + \frac{\cos A}{\sin A} = \frac{1 + \cos A}{\sin A} = \text{RHS (दक्षिण पक्ष)}
\end{aligned}$$

**उदाहरण-12.** सिद्ध कीजिए कि  $\left( \frac{1 + \tan^2 A}{1 + \cot^2 A} \right) = \left( \frac{1 - \tan A}{1 - \cot A} \right)^2 = \tan^2 A$

**हल:** LHS (वाम पक्ष)

$$\begin{aligned}
&= \frac{1 + \tan^2 A}{1 + \cot^2 A} = \frac{\sec^2 A}{\operatorname{cosec}^2 A} \\
&= \left[ \frac{\sec A}{\operatorname{cosec} A} \right]^2 = \left[ \frac{1/\cos A}{1/\sin A} \right]^2 = \left[ \frac{1}{\cos A} \times \frac{\sin A}{1} \right]^2 \\
&= \left[ \frac{\sin A}{\cos A} \right]^2 = [\tan A]^2 = \tan^2 A = \text{RHS (दक्षिण पक्ष)}
\end{aligned}$$

अब

$$\left[ \frac{1 - \tan A}{1 - \cot A} \right]^2 = \left[ \frac{1 - \frac{\sin A}{\cos A}}{1 - \frac{\cos A}{\sin A}} \right]^2 = \left[ \frac{\frac{\cos A - \sin A}{\cos A}}{\frac{\sin A - \cos A}{\sin A}} \right]^2$$

$$= \left[ \frac{\cos A - \sin A}{\cos A} \times \frac{\sin A}{\sin A - \cos A} \right]^2 = \left[ -\frac{(\sin A - \cos A)}{\cos A} \times \frac{\sin A}{(\sin A - \cos A)} \right]^2$$

$$= \left[ -\frac{\sin A}{\cos A} \right]^2 = [-\tan A]^2 = \tan^2 A = \text{RHS (दक्षिण पक्ष)}$$

### प्रश्नमाला 7.1

1.  $\angle \theta$  के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को  $\sec \theta$  के पदों में व्यक्त कीजिए।
2. त्रिकोणमितीय अनुपातों  $\sin \theta$ ,  $\sec \theta$ ,  $\tan \theta$  को  $\cot \theta$  के पदों में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को सर्वसमिकाओं की सहायता से सिद्ध कीजिए।
3.  $\cos^2 \theta + \cos^2 \theta \cot^2 \theta = \cot^2 \theta$
4.  $\sec \theta (1 - \sin \theta)(\sec \theta + \tan \theta) = 1$
7.  $\operatorname{cosec}^2 \theta + \sec^2 \theta = \operatorname{cosec}^2 \theta \sec^2 \theta$
6.  $\sqrt{\frac{1 - \sin \theta}{1 + \sin \theta}} = \sec \theta - \tan \theta$
7.  $\sqrt{\sec^2 \theta + \operatorname{cosec}^2 \theta} = \tan \theta + \cot \theta$
8.  $\frac{\tan \alpha + \tan \beta}{\cot \alpha + \cot \beta} = \tan \alpha \tan \beta$
9.  $\frac{1 + \sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\cos \theta}{1 + \sin \theta} = 2 \sec \theta$
10.  $\frac{\sin^4 \theta - \cos^4 \theta}{\sin^2 \theta - \cos^2 \theta} = 1$
11.  $\cot \theta - \tan \theta = \frac{1 - 2 \sin^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta}$
12.  $\cos^4 \theta + \sin^4 \theta = 1 - 2 \cos^2 \theta \sin^2 \theta$
13.  $(\sec \theta - \cos \theta)(\cot \theta + \tan \theta) = \tan \theta \sec \theta$
14.  $\frac{1 - \tan^2 \alpha}{\cot^2 \alpha - 1} = \tan^2 \alpha$
15.  $\frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta} = \frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta}$
16.  $\sin^6 \theta + \cos^6 \theta = 1 - 3 \sin^2 \theta \cos^2 \theta$
17.  $\frac{\tan \theta}{1 - \cot \theta} + \frac{\cot \theta}{1 - \tan \theta} = 1 + \tan \theta + \cot \theta$
18.  $\sin \theta (1 + \tan \theta) + \cos \theta (1 + \cot \theta) = \operatorname{cosec} \theta + \sec \theta$

$$19. \sin^2 \theta \cos \theta + \tan \theta \sin \theta + \cos^3 \theta = \sec \theta$$

$$20. \frac{\tan \theta}{1 - \cot \theta} + \frac{\cot \theta}{1 - \tan \theta} = 1 + \sec \theta \cos \theta$$

$$21. (\sin A + \sec A)^2 + (\cos A + \sec A)^2 = 7 + \tan^2 A + \cot^2 A$$

$$22. \sin^8 \theta - \cos^8 \theta = (\sin^2 \theta - \cos^2 \theta)(1 - 2\sin^2 \theta \cos^2 \theta)$$

$$23. \sqrt{\frac{\sec \theta + 1}{\sec \theta - 1}} = \cot \theta + \cos \theta$$

$$24. \frac{(1 + \cot \theta + \tan \theta)(\sin \theta - \cos \theta)}{\sec^3 \theta - \cos \theta} = \sin^2 \theta \cos^2 \theta$$

$$27. \frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sin \theta - \cos \theta} + \frac{\sin \theta - \cos \theta}{\sin \theta + \cos \theta} = \frac{2}{1 - 2\cos^2 \theta} = \frac{2}{2\sin^2 \theta - 1}$$

$$26. \frac{\cos A}{1 - \tan A} + \frac{\sin A}{1 - \cot A} = \sin A + \cos A$$

$$27. (\cos \theta - \sin \theta)(\sec \theta - \cos \theta) = \frac{1}{\tan \theta + \cot \theta}$$

$$28. \frac{\cos^2 \theta}{1 - \tan \theta} + \frac{\sin^3 \theta}{\sin \theta - \cos \theta} = 1 + \sin \theta \cos \theta$$

$$29. \text{ यदि } \sec \theta + \tan \theta = P \text{ हो, तो सिद्ध करो कि } \frac{P^2 - 1}{P^2 + 1} = \sin \theta$$

$$30. \text{ यदि } \frac{\cos A}{\cos B} = m \text{ तथा } \frac{\cos A}{\sin B} = n \text{ हो, तो सिद्ध कीजिए } (m^2 + n^2)\cos^2 B = n^2$$



## पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात

### पूरक कोण

यदि दो कोणों का योग  $90^\circ$  हो तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। किसी न्यून कोण  $\theta$  का पूरक कोण  $(90^\circ - \theta)$  होगा। समकोण  $\triangle ABC$  में  $\angle B$  समकोण हो तो  $\angle A$  व  $\angle C$  का योफल समकोण होगा।

$$\angle A + \angle C = 90^\circ$$

यदि  $\angle A = \theta$  तो

$$\angle C = 90^\circ - \theta \text{ होगा}$$

अतः  $\theta$  व  $90^\circ - \theta$  परस्पर पूरक कोण होंगे


समकोण  $\triangle ABC$  में कोण  $\theta$  के लिए भुजा BC तथा AB क्रमशः लम्ब व आधार होंगे।

समकोण  $\triangle ABC$  में  $(90^\circ - \theta)$  के लिए भुजा AB तथा BC क्रमशः लम्ब व आधार होंगे।

अतः  $\triangle ABC$  में को  $(90^\circ - \theta)$  व  $\theta$  के लिए त्रिकोणमिती अनुपात

$$\sin(90^\circ - \theta) = \frac{AB}{AC}$$

$$\sin \theta = \frac{BC}{AC}$$



आकृति 7.02

$$\cos(90^\circ - \theta) = \frac{BC}{AC}$$

$$\cos \theta = \frac{AB}{AC}$$

$$\tan(90^\circ - \theta) = \frac{AB}{BC}$$

$$\tan \theta = \frac{BC}{AB}$$

$$\cot(90^\circ - \theta) = \frac{BC}{AB}$$

$$\cot \theta = \frac{AB}{BC}$$

$$\sec(90^\circ - \theta) = \frac{AC}{BC}$$

$$\sec \theta = \frac{AC}{AB}$$

$$\operatorname{cosec}(90^\circ - \theta) = \frac{AC}{AB}$$

$$\operatorname{cosec} \theta = \frac{AC}{BC}$$

उपर्युक्त समीकरणों की तुलना करने पर

$$\sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta$$

$$\cos(90^\circ - \theta) = \sin \theta$$

$$\tan(90^\circ - \theta) = \cot \theta$$

$$\cot(90^\circ - \theta) = \tan \theta$$

$$\sec(90^\circ - \theta) = \operatorname{cosec} \theta$$

$$\operatorname{cosec}(90^\circ - \theta) = \sec \theta$$

जब  $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$

टिप्पणी: हम कह सकते हैं कि

किसी कोण का  $\sin$  = उसके पूरक कोण का  $\cos$

किसी कोण का  $\tan$  = उसके पूरक कोण का  $\cot$

किसी कोण का  $\sec$  = उसके पूरक कोण का  $\operatorname{cosec}$

इनका विलोम भी सत्य है।

### दृष्टांतीय उदाहरण

**उदाहरण-13.**  $\frac{\tan 49^\circ}{\cot 41^\circ}$  का मान ज्ञात कीजिए।

**हल:**  $\tan 49^\circ = \cot(90^\circ - 49^\circ) = \cot 41^\circ$   $\{\tan \theta = \cot(90 - \theta)\}$

$$\therefore \frac{\tan 49^\circ}{\cot 41^\circ} = \frac{\cot 41^\circ}{\cot 41^\circ} = 1$$

**उदाहरण-14.**  $\sin^2 50^\circ + \sin^2 40^\circ$  का मान ज्ञात कीजिए।

**हल:**  $\therefore 40^\circ = 90^\circ - 50^\circ$

$$\therefore \sin 40^\circ = \sin(90^\circ - 50^\circ) = \cos 50^\circ$$

$$\text{अतः } \sin^2 50^\circ + \sin^2 40^\circ = \sin^2 50^\circ + \cos^2 50^\circ = 1 \quad (\because \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1)$$

**उदाहरण-15.**  $\tan 39^\circ - \cot 51^\circ$  का मान ज्ञात कीजिए।

**हल:**  $\tan 39^\circ = \cot(90 - 39^\circ) = \cot 51^\circ$

$$\text{अतः } \tan 39^\circ - \cot 51^\circ = \cot 51^\circ - \cot 51^\circ = 0$$

**उदाहरण-16.**  $\sec 50^\circ \sin 40^\circ + \cos 40^\circ \operatorname{cosec} 50^\circ$  का मान ज्ञात कीजिए।

**हल:**  $\sec 50^\circ \sin 40^\circ + \cos 40^\circ \operatorname{cosec} 50^\circ$   
 $= \operatorname{cosec} 40^\circ \sin 40^\circ + \cos 40^\circ \operatorname{cosec} (90^\circ - 40^\circ)$   
 $= \operatorname{cosec} 40^\circ \sin 40^\circ + \cos 40^\circ \sec 40^\circ$   
 $= \frac{1}{\sin 40^\circ} \cdot \sin 40^\circ + \cos 40^\circ \cdot \frac{1}{\cos 40^\circ} = 1 + 1 = 2$

**उदाहरण-17.** सिद्ध कीजिए  $\tan 15^\circ \tan 20^\circ \tan 70^\circ \tan 75^\circ = 1$

**हल:** वाम पक्ष (LHS)  $= \tan 15^\circ \tan 20^\circ \tan 70^\circ \tan 75^\circ$   
 $= \tan 15^\circ \tan 20^\circ \tan (90^\circ - 20^\circ) \tan (90^\circ - 15^\circ)$   
 $= \tan 15^\circ \tan 20^\circ \cdot \cot 20^\circ \cdot \cot 15^\circ$   
 $= \tan 15^\circ \tan 20^\circ \cdot \frac{1}{\tan 20^\circ \tan 15^\circ} = 1 \text{ (RHS)}$

**उदाहरण-18.** यदि  $\tan 2A = \cot (A - 18^\circ)$  हो तो A का मान ज्ञात कीजिए।

**हल:**  $\tan 2A = \tan [90 - (A - 18^\circ)]$   
 $\tan 2A = \tan (108 - A)$   
 $\therefore 2A = 108^\circ - A$   
 $3A = 108^\circ \Rightarrow A = 36^\circ$

**उदाहरण-19.** निम्न समीकरण से x का मान ज्ञात कीजिए?

$$\operatorname{cosec} (90^\circ - \theta) + x \cos \theta \cot (90^\circ - \theta) = \sin (90^\circ - \theta)$$

**हल:**  $\operatorname{cosec} (90^\circ - \theta) + x \cos \theta \cot (90^\circ - \theta) = \sin (90^\circ - \theta)$

$$\sec \theta + x \cos \theta \tan \theta = \cos \theta$$

$$x \sin \theta = \cos \theta - \sec \theta \quad \left( \because \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \right)$$

$$x = \frac{\cos \theta - \sec \theta}{\sin \theta} = \frac{\cos^2 \theta - 1}{\sin \theta \cos \theta} \quad \left( \because \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} \right)$$

$$= - \left[ \frac{1 - \cos^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} \right] \quad \left( \because 1 - \cos^2 \theta = \sin^2 \theta \right)$$

$$= - \frac{\sin^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} \quad x = - \tan \theta$$

## प्रश्नमाला 7.2

निम्नलिखित के मान ज्ञात करो।

1. (i)  $\frac{\cos 37^\circ}{\sin 53^\circ}$                       (ii)  $\frac{\cos \operatorname{ec} 32^\circ}{\sec 58^\circ}$                       (iii)  $\frac{\tan 10^\circ}{\cot 80^\circ}$                       (iv)  $\frac{\cos 19^\circ}{\sin 71^\circ}$
2. (i)  $\cos \operatorname{ec} 25^\circ - \sec 65^\circ$                       (ii)  $\cot 34^\circ - \tan 56^\circ$   
(iii)  $\frac{\sin 36^\circ}{\cos 54^\circ} - \frac{\sin 54^\circ}{\cos 36^\circ}$                       (iv)  $\sin \theta \cos(90^\circ - \theta) + \cos \theta \sin(90^\circ - \theta)$
3. (i)  $\sin 70^\circ \sin 20^\circ - \cos 20^\circ \cos \operatorname{ec} 70^\circ$                       (ii)  $\frac{2 \cos 67^\circ}{\sin 23^\circ} - \frac{\tan 40^\circ}{\cot 50^\circ} - \cos 60^\circ$
4. (i)  $\left(\frac{\sin 35^\circ}{\cos 55^\circ}\right)^2 + \left(\frac{\cos 55^\circ}{\sin 35^\circ}\right)^2 - 2 \cos 60^\circ$                       (ii)  $\left(\frac{\sin 27^\circ}{\cos 63^\circ}\right)^2 + \left(\frac{\cos 63^\circ}{\sin 27^\circ}\right)^2$
5. (i)  $\cot 12^\circ \cot 38^\circ \cot 52^\circ \cot 60^\circ \cot 78^\circ$                       (ii)  $\tan 5^\circ \tan 25^\circ \tan 30^\circ \tan 45^\circ \tan 65^\circ \tan 85^\circ$
6. निम्न को  $0^\circ$  से  $45^\circ$  के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपदों के पदों में व्यक्त कीजिए  
(i)  $\sin 81^\circ + \sin 71^\circ$                       (ii)  $\tan 68^\circ + \sec 68^\circ$

निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए:

7.  $\sin 65^\circ + \cos 25^\circ = 2 \cos 25^\circ$                       8.  $\sin 35^\circ \sin 55^\circ - \cos 35^\circ \cos 55^\circ = 0$
9.  $\frac{\cos 70^\circ}{\sin 20^\circ} + \frac{\cos 59^\circ}{\sin 31^\circ} - 8 \sin^2 30^\circ = 0$                       10.  $\sin(90^\circ - \theta) \cos(90^\circ - \theta) = \frac{\tan \theta}{1 + \tan^2 \theta}$
11.  $\frac{\cos(90^\circ - \theta) \cos \theta}{\tan \theta} + \cos^2(90^\circ - \theta) = 1$                       12.  $\frac{\tan(90^\circ - \theta) \cot \theta}{\operatorname{cosec}^2 \theta} - \cos^2 \theta = 0$
13.  $\frac{\cos(90^\circ - \theta) \sin(90^\circ - \theta)}{\tan(90^\circ - \theta)} = \sin^2 \theta$
14.  $\frac{\sin \theta \cos(90^\circ - \theta) \cos \theta}{\sec(90^\circ - \theta)} + \frac{\cos \theta \sin(90^\circ - \theta) \sin \theta}{\operatorname{cosec}(90^\circ - \theta)} = \sin \theta \cos \theta$
17. यदि  $\sin 3\theta = \cos(\theta - 6^\circ)$  यहाँ  $3\theta$  और  $(\theta - 6^\circ)$  न्यूनकोण है तो  $\theta$  का मान ज्ञात कीजिए।
16. यदि  $\sec 5\theta = \operatorname{cosec}(\theta - 36^\circ)$  यहाँ  $5\theta$  एक न्यूनकोण है तो  $\theta$  का मान ज्ञात कीजिए।
17. यदि A, B और C किसी त्रिभुज ABC के अन्तः कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि  $\tan\left(\frac{B+C}{2}\right) = \cot \frac{A}{2}$
18. यदि  $\cos 2\theta = \sin 4\theta$  हो और  $2\theta$  व  $4\theta$  न्यूनकोण हो तो  $\theta$  का मान ज्ञात कीजिए।

**उत्तरमाला**  
**प्रश्नमाला 7.1**

1.  $\sin \theta = \frac{\sqrt{\sec^2 \theta - 1}}{\sec \theta}$ ,  $\cos \theta = \frac{1}{\sec \theta}$ ,  $\tan \theta = \sqrt{\sec^2 \theta - 1}$ ,  $\cot \theta = \frac{1}{\sqrt{\sec^2 \theta - 1}}$ ,  $\operatorname{cosec} \theta = \frac{\sec \theta}{\sqrt{\sec^2 \theta - 1}}$

2. (i)  $\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{1 + \cot^2 \theta}}$ ,  $\tan \theta = \frac{1}{\cot \theta}$ ,  $\sec \theta = \frac{\sqrt{1 + \cot^2 \theta}}{\cot \theta}$

**प्रश्नमाला 7.2**

1. (i) 1      (ii) 1      (iii) 1      (iv) 1      2. (i) 0      (ii) 0      (iii) 0      (iv) 1

3. (i) 0      (ii)  $1/2$       4. (i) 1      (ii) 2      5. (i)  $\frac{1}{\sqrt{3}}$       (ii)  $\frac{1}{\sqrt{3}}$

6. (i)  $\cos 9^\circ + \cos 19^\circ$       (ii)  $\cot 22^\circ + \operatorname{cosec} 22^\circ$       15.  $\theta = 24^\circ$       16.  $\theta = 21^\circ$

18.  $\theta = 15^\circ$